

GUIA DE APOIO



O Serviço de Ginecologia
está sempre ao seu dispor.

Telefone Geral: 239 400 200


Secretariado: Extensão 2299

Gabinete de Enfermagem: Extensão 2399

**Desejamos-lhe
rápidas melhoras.**

CONSELHOS APÓS TRATAMENTO DE VAPORIZAÇÃO COM LASER DO COLO DO ÚTERO

SERVIÇO DE GINECOLOGIA
IPO DE COIMBRA




IPO DE COIMBRA

Edição: IPO de Coimbra
Texto: Serviço de Ginecologia
Coordenação: Grupo Coordenador da Informação
Projeto Gráfico: EmsDesign
Impressão: Studioprint 360
500 Exemplares. Distribuição Gratuita
Abril 2016

CONSELHOS APÓS TRATAMENTO DE VAPORIZAÇÃO COM LASER DO COLO DO ÚTERO

SERVIÇO DE GINECOLOGIA
IPO DE COIMBRA



NOTE BEM

- O tratamento de vaporização com laser do colo do útero pode provocar um corrimento vaginal ensanguentado, inferior a uma menstruação, que se prolonga de forma intermitente cerca de três semanas.
- Pode haver também algum desconforto, dor pélvica ou cólica nos primeiros dias após o tratamento. Deve fazer medicação analgésica (paracetamol, ibuprofeno ou outra prescrita pelo médico).
- Caso haja uma hemorragia superior a uma menstruação, dor persistente, corrimento purulento ou febre, contacte-nos ou recorra ao serviço de urgência de ginecologia do hospital mais próximo.

O QUE DEVE FAZER

- Medicação analgésica e anti-inflamatória por via oral nos primeiros dias, caso tenha dores.
- Aplicar a medicação tópica prescrita, conforme orientação do seu médico.

O QUE DEVE EVITAR

Durante as três primeiras semanas, após o tratamento:

- Ter relações sexuais;
- Usar tampões vaginais;
- Fazer irrigações vaginais;
- Tomar banho de imersão (banheira, piscina ou mar).

**Compareça na próxima consulta
(assinale bem a data).**