


# GUIA DE APOIO



## Conselhos Após Histeroscopia

SERVIÇO DE GINECOLOGIA  
IPO DE COIMBRA



# Conselhos Após Histeroscopia

SERVIÇO DE GINECOLOGIA  
IPO DE COIMBRA

## Tenha em atenção

- Pode ter um corrimento ensanguentado, em pequena quantidade, durante alguns dias após o exame.
- Se tiver hemorragia vaginal superior à menstruação habitual, dores persistentes e/ou febre, nas primeiras 48 horas após o exame, contacte-nos ou recorra às urgências do hospital mais próximo.

## O que não deve fazer

- Ter relações sexuais durante os três primeiros dias, após o exame.
- Esforços físicos intensos nos dois a três primeiros dias após o exame.



O Serviço de Ginecologia  
está sempre ao seu dispor.

Telefone Geral **239 400 200**  
Secretariado: Extensão **2299**  
Gabinete de Enfermagem: Extensão **2399**

**Desejamos-lhe rápidas melhoras.**



IPO DE COIMBRA

Edição: IPO de Coimbra  
Texto: Serviço de Ginecologia  
Coordenação: Grupo Coordenador da Informação  
Projeto Gráfico: EmsDesign  
Impressão: Studioprint 360  
500 Exemplos. Distribuição Gratuita  
Dezembro 2014