

# Informação sobre o seu Tratamento: BEVACIZUMAB

Possíveis Efeitos Secundários (mais frequentes)	Recomendações
Dor de estômago	O seu médico poderá prescrever medicação para prevenir hemorragias/perfuração gastrointestinal em caso de risco elevado (inibidores da bomba de protões ou antagonistas H2)
Hipertensão arterial	Deve vigiar a tensão arterial uma vez por dia e registar afim de entregar na consulta ao seu médico oncologista que medicará ou ajustará a sua medicação anti hipertensora.
Tromboembolismo Venoso/arterial	Pode ocorrer numa pequena percentagem de doentes, dependente de outros fatores de risco. Poderá manifestar-se como achado em exames de imagem e não causar sintomas. Em caso dificuldade respiratória, tosse, dor no peito, dor na perna (especialmente se fica edemaciada, quente, vermelho e doloroso), deve recorrer ao serviço de urgência da área de residência.
Hemorragia	Pode sangrar pelo nariz, gengiva, estoma ou pelo tumor (se ainda não foi operado). Em regra, são pequenas perdas autolimitadas controláveis com pressão local e aplicação de frio (gelo). Se grave ou persistir deve recorrer ao serviço de urgência da área de residência
Perda de proteínas pela urina	Antes de cada tratamento, o enfermeiro do Hospital de Dia realizará um teste à urina, <i>dipstick</i> , a fim de avaliar se perde proteínas pela urina; caso isto se verifique a equipa médica será contactada para quantificar esta perda na urina das 24 horas.
Alterações na cicatrização	Se ocorrer algum traumatismo com ferida aberta durante o tratamento, deve avisar o médico que o assiste que está a realizar bevacizumab, dado que atrasa o processo de cicatrização.

Para esclarecimento de dúvidas relacionadas com [a terapêutica oral e receitas de ambulatório](#) pode contactar o Serviço de Farmácia Hospitalar do IPO de Coimbra, [das 14 h às 16h](#), através do número [96 713 21 93](#).