

Informação sobre o seu Tratamento: CETUXIMAB

Possíveis Efeitos Secundários (mais frequentes)	Recomendações
Alergia	Durante a administração do medicamento, pode ocorrer reação alérgica, pelo que será vigiado de forma intensiva pelo seu enfermeiro. No entanto deve chamá-lo sempre que sentir sintomas (calor, mal-estar, suores)
Rash acneiforme	Surgirão, nas primeiras 3 semanas, lesões na face semelhantes ao acne. Podem causar comichão. Deve manter uma boa hidratação da pele (loção sem álcool e não perfumada) + creme ureia 10% + protetor solar (as radiações ultravioletas agravam a reação na pele). O seu médico ajustará a medicação á medida que as lesões surgem e evoluem.
Descida do valor de magnésio	Pode ser detetada nas análises que realiza antes do tratamento. Se indicado, será medicado para correção desta situação.
Alterações nas unhas	São raras, mas causam desconforto pelo que deve contactar equipa médica ou de enfermagem do Hospital de Dia para avaliação e medicação.

Para esclarecimento de dúvidas relacionadas com [a terapêutica oral e receitas de ambulatório](#) pode contactar o Serviço de Farmácia Hospitalar do IPO de Coimbra, [das 14 h às 16h](#), através do número [96 713 21 93](#).